

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

2014

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

ԹԵՍ 3

Խմբի համարը

Նստարանի համարը

Հարգելի՝ դիմորդ

Խորհուրդ ենք տալիս առաջադրանքները կատարել ըստ հերթականության: Ուշադիր կարդացե՛ք յուրաքանչյուր առաջադրանքի պահանջը և պատասխանների առաջարկվող տարրերակները: Եթե Ձեզ չի հաջողվում որևէ առաջադրանքի անմիջապես պատասխանել, ժամանակը խնայելու նպատակով կարող եք այն բաց բողնել և դրան անդրադառնալ ավելի ուշ:

Ձեր առջև դրված թեստ-գրքույկի էջերի դաստիարակ մասերը ազատորեն կարող եք օգտագործել սևագրության համար: **Թեստ-գրքույկը չի ստուգվում: Ստուգվում է միայն պատասխանների ճնարությունը:**

Առաջադրանքները կատարելուց հետո չմոռանաք պատասխանները ուշադիր և խնամքով նշել պատասխանների ճնարություն: Պատասխանների ճնարութիւնը լրացնից է կախված Ձեր քննական միավորի ճշտությունը:

Ցանկանում ենք հաջողություն:

Ա մակարդակ

I. Տրված են 6; 17; 18; 24; 29 թվերը:

1 Այդ թվերից քանի՞սն է պարզ թիվ:

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 5
- 4) 3

2 Այդ թվերից քանի՞սն են 6-ի բազմապատիկ:

- 1) 0
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 3

3 Առաջին թիվը չորրորդ թվի ո՞ր տոկոսն է:

- 1) 25
- 2) 0,25
- 3) 20
- 4) 400

4 Տրված երկնիշ թվերից ո՞րն ունի ավելի մեծ թվով բաժանարարներ:

- 1) 17
- 2) 18
- 3) 29
- 4) 24

II. Գտնել արտահայտության արժեքը.

5 $3\frac{1}{4} - 2\frac{3}{5}$:

- 1) 1,15
- 2) $1\frac{1}{2}$
- 3) $\frac{13}{20}$
- 4) $-\frac{1}{5}$

6 $(\sqrt{63} + \sqrt{28}) : \sqrt{7}$:

- 1) $\sqrt{\frac{91}{7}}$
- 2) $\sqrt{28}$
- 3) $\frac{91}{7}$
- 4) 5

7 $\cos 30^\circ + \sin 60^\circ$:

- 1) $\sqrt{3}$
- 2) $\cos 90^\circ$
- 3) $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$
- 4) 1

8 $3^{2+\log_{\sqrt{3}} 4}$:

- 1) $\log_3 8$
- 2) 144
- 3) 25
- 4) 16

III. Կատարել առաջադրանքները.

9

Նշված միջակայքերից ո՞րին է պատկանում $\frac{2x+5}{5} = \frac{3x+1}{4}$ հավասարման արմատը.

- 1) $[5; 6]$
- 2) $(0; 2)$
- 3) $[2; 3]$
- 4) $(3; 5)$

10

Գտնել $|6x - 11| = 7$ հավասարման արմատների գումարը:

- 1) $4\frac{1}{2}$
- 2) 3
- 3) 4
- 4) $3\frac{2}{3}$

11

Գտնել $\sqrt{0,5x - 7} = 3$ հավասարման արմատը:

- 1) 32
- 2) 8
- 3) 20
- 4) 24

12

Գտնել $3^{x^2-5x-3} = 9$ հավասարման արմատների արտադրյալը:

- 1) -6
- 2) -5
- 3) -3
- 4) 5

IV. Լուծել անհավասարումը.

13 $5(x + 3) < 2x :$

- 1) $(1; +\infty)$
- 2) $(-\infty; -5)$
- 3) $[-5; 0)$
- 4) $[0; 1]$

14 $2^{x-1} \cdot 2^{x+1} < 1 :$

- 1) $[1; +\infty)$
- 2) \emptyset
- 3) $(-\infty; 0)$
- 4) $[0; 1)$

15 $\log_2(x - 1) > 2 :$

- 1) $(5; +\infty)$
- 2) \emptyset
- 3) $(-\infty; 1)$
- 4) $[1; 5]$

16 $|x - 2| < 1 :$

- 1) $(-\infty; 3)$
- 2) $(1; 3)$
- 3) $(-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$
- 4) $(-1; 1)$

V. Կատարել առաջադրանքները.

17

Գտնել (a_n) թվաբանական պրոգրեսիայի առաջին անդամը, եթե $3a_5 - a_{13} = 10$:

- 1) 10
- 2) 5
- 3) 7
- 4) 9

18

Գտնել 7-ի բազմապատիկ բոլոր երկնիշ թվերի գումարը:

- 1) 735
- 2) 672
- 3) 714
- 4) 728

19

Գտնել (b_n) երկրաչափական պրոգրեսիայի այն անդամի համարը, որը հավասար է 48-ի, եթե $b_1 = 3$, $q = 2$:

- 1) 5
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

20

Գտնել x -ը, եթե $\frac{x}{2} + 1$, $2x - 1$, $6x - 8$ հաջորդականությունը երկրաչափական պրոցեսիա է:

- 1) 4
- 2) 2,5
- 3) 3
- 4) 3,5

VI. A -ից B 800 կմ ճանապարհն ըստ չվացուցակի գնացքը պետք է անցներ 10 ժամում:
Ծարժումն սկսելուց 4 ժամ հետո գնացքը C կայարանում հարկադրաբար 1 ժամ
կանգնեց, որից հետո ավելացնելով նախատեսված արագությունը՝ ժամանակին
հասավ B կայարան:

21 Քանի՞ կմ/ժ է գնացքի արագությունն ըստ չվացուցակի:

- 1) 75
- 2) 60
- 3) 80
- 4) 70

22 Քանի՞ կմ է AC հեռավորությունը:

- 1) 350
- 2) 300
- 3) 320
- 4) 280

23 Քանի՞ կմ/ժ արագությամբ անցավ գնացքը CB ճանապարհահատվածը:

- 1) 88
- 2) 96
- 3) 90
- 4) 92

24 Ինչքա՞ն ժամանակ ծախսեց գնացքն AB ճանապարհի առաջին կեսն անցնելու
համար:

- 1) 5ժ 50ր
- 2) 4ժ 40ր
- 3) 5ժ
- 4) 4ժ 20ր

VII. Տրված է $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \ln 2$ ֆունկցիան:

25 Գտնել f ֆունկցիայի կրիտիկական կետերը:

- 1) \emptyset
- 2) $\frac{1-\sqrt{7}}{2}$ և $\frac{1+\sqrt{7}}{2}$
- 3) -1 և 2
- 4) $\frac{3-\sqrt{57}}{4}$ և $\frac{3+\sqrt{57}}{4}$

26 Գտնել f ֆունկցիայի նվազման միջակայքերը:

- 1) $(-\infty; -1] \cup [2; +\infty)$
- 2) $\left[\frac{1-\sqrt{7}}{2}; \frac{1+\sqrt{7}}{2} \right]$
- 3) $\left[\frac{-\sqrt{57}}{4}; \frac{3+\sqrt{57}}{4} \right]$
- 4) $[-1; 2]$

27 Գտնել f ֆունկցիայի մինիմումի կետը:

- 1) 2
- 2) -1
- 3) $\frac{3+\sqrt{57}}{4}$
- 4) $\frac{1+\sqrt{7}}{2}$

28 Գտնել f ֆունկցիայի գրաֆիկի այն կետերի արագիսները, որոնցում գրաֆիկին տարված շոշափողը արագիսների առանցքի հետ կազմում է 135° անկյուն:

- 1) $\frac{\sqrt{13}-1}{2}$
- 2) $\frac{1\pm\sqrt{13}}{2}$
- 3) $\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$
- 4) $\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$

VIII. Տրված են $A(-1; 5)$, $B(5; 1)$ և $O(0; 0)$ կետերը:

29

Գտնել \overrightarrow{AB} վեկտորի կոորդինատները:

- 1) $\{4; -6\}$
- 2) $\{6; -4\}$
- 3) $\{4; -4\}$
- 4) $\{-6; 6\}$

30

Գտնել BA հատվածի միջնակետի կոորդինատները:

- 1) $(3; 2)$
- 2) $(2; 2)$
- 3) $(2; 3)$
- 4) $(3; 3)$

31

Գտնել \overrightarrow{BA} վեկտորի երկարությունը:

- 1) 5
- 2) $2\sqrt{13}$
- 3) 4
- 4) $2\sqrt{11}$

32

Գտնել \overrightarrow{OB} և \overrightarrow{AO} վեկտորների կազմած անկյունը:

- 1) 60^0
- 2) 45^0
- 3) 30^0
- 4) 90^0

IX. Ուղանկյունանիստի հիմքի կողմերը 3սմ և 4սմ են, իսկ կողմնային կողը՝ 5սմ:

33

Գտնել ուղանկյունանիստի լրիվ մակերևույթի մակերեսը:

- 1) 12 սմ^2
- 2) 70 սմ^2
- 3) 94 սմ^2
- 4) 60 սմ^2

34

Գտնել ուղանկյունանիստի ծավալը:

- 1) 60սմ^3
- 2) 94 սմ^3
- 3) 70 սմ^3
- 4) 48 սմ^3

35

Գտնել ուղանկյունանիստի անկյունագծային հատույթի մակերեսը:

- 1) 60 սմ^2
- 2) 25 սմ^2
- 3) $4\sqrt{34} \text{ սմ}^2$
- 4) $3\sqrt{41} \text{ սմ}^2$

36

Գտնել ուղանկյունանիստի անկյունագծի և հիմքի հարթության կազմած անկյունը:

- 1) 60°
- 2) 90°
- 3) 45°
- 4) 30°

X. Տրված է $\sqrt{70-x^2} \left(\sin \pi x - 2 \cos \frac{\pi x}{2} \right) = 0$ հավասարումը:

37 Հանի՞՞ ամբողջ թիվ է պարունակում հավասարման ԹԱՔ-ը:

38 Հանի՞՞ ամբողջ արմատ ունի հավասարումը:

39 Ո՞րն է հավասարման ամենամեծ ամբողջ արմատը:

40 Հանի՞՞ արմատ ունի հավասարումը:

XI. ABC ռողանկյուն եռանկյան A անկյան կիսորդը BC էջը հատում է D կետում: D կետով տարված է AC -ին զուգահեռ ուղիղ, որն AB ներքնաձիգը հատում է E կետում: Հայտնի է, որ $AE = 20$, $CD = 12$:

41 Գտնել DE հատվածի երկարությունը:

42 Գտնել BD հատվածի երկարությունը:

43 Գտնել ADE եռանկյան մակերեսը:

44 Գտնել $2\sqrt{5} \cdot O_1O_2$ -ը, որտեղ O_1 -ը և O_2 -ը ABC եռանկյանն արտագծած և ներգծած շրջանագծերի կենտրոններն են:

XII. Տրված է $f(x) = |x^2 - 6x + 5|$ ֆունկցիան:

45 Ճիշտ են արդյոք հետևյալ պնդումները:

1. $(-\infty; 3]$ միջակայքում ֆունկցիան նվազող է:

2. 2π -ում $F(x) = f(\sin x)$ ֆունկցիայի պարբերություն է:

3. $f(x) = \sin x$ հավասարումը $[\pi; 2\pi]$ միջակայքում ունի մեկ արմատ:

4. $f(x) = 4$ հավասարումն ունի երեք արմատ:

5. f ֆունկցիայի գրաֆիկն արսցիսների առանցքը հատում է երկու կետում:

6. $F(x) = f(x+3)$ ֆունկցիան զույգ է:

Բ մակարդակ

XIII. Տրված է $f(x) = \log_5 \sqrt{25 - x^2} + \frac{1}{1 + |x|}$ ֆունկցիան:

46 Գտնել f ֆունկցիայի որոշման տիրույթին չպատկանող ամենափոքր թվականը թիվը:

47 Գտնել f ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը:

48 Գտնել f ֆունկցիայի նվազման միջակայքին պատկանող ամբողջ թվերի միջին թվաբանականը:

49 Գտնել այն k ամբողջ թվերի քանակը, որոնց դեպքում $f(k) < f(3)$:

XIV. Դպրոցի շրջանավարտների 15% -ը գերազանցիկ են, ընդ որում տղաների 10%-ն են գերազանցիկ, իսկ աղջկների՝ 30%-ը:

50 Տղաների քանակը աղջկների քանակից քանի՞ տոլեռով է ավելի:

51 Գտնել գերազանցիկ աղջկների և գերազանցիկ տղաների քանակների հարաբերությունը:

52 Ծրջանավարտների ո՞ր տոլեռն են կազմում տղաները:

53 Ամենաքիչը քանի՞ շրջանավարտ կարող է ունենալ այդպիսի դպրոցը:

XV. Ծրջանագծին ներգծած $ABCD$ քառանկյան BD անկյունագիծը կիսում է B անկյունը և AC անկյունագիծը հատում E կետում: $BC = 20$, $CD = 15$, $CE = 12$:

54 Գտնել AD կողմի երկարությունը:

55 Գտնել ED հատվածի երկարությունը:

56 Գտնել BCD անկյան աստիճանային չափը:

57 Գտնել $ABCD$ քառանկյան մակերեսը:

XVI. Գտնել արտահայտության արժեքը.

58 $(2\sqrt[4]{3} + 5) \left(\frac{2\sqrt{3} + 5\sqrt[4]{3}}{4\sqrt{3} + 20\sqrt[4]{3} + 25} - \frac{\sqrt[4]{3} - 5}{2\sqrt[4]{3} + 5} \right)$:

59 $\frac{\arccos(-1)}{\arcsin\frac{1}{3} + \arccos\frac{1}{3}}$:

60 $2^{\log_{2\sqrt{3}} 2} \cdot 3^{\log_{12} 288}$

61 $16 \sin 9^\circ \cdot \sin 81^\circ \cdot \sin 54^\circ$:

XVII. Կատարել առաջադրանքները.

62

Զանի՝ եղանակով կարելի է ջոկի 8 զինվորներին բաժանել երեք խմբի այնպես, որ մի խմբում լինի 2, իսկ մյուս խմբերում՝ 3-ական զինվոր:

63

Գտնել այն բոլոր “բառերի” քանակը, որոնք բաղկացած են 4 հատ Ա և 2 հատ Բ տառերից:

XVIII. O կետից տարված են OA, OM, ON ճառագայթներն այնպես, որ $\angle MON = 90^\circ$, $\angle AON = \angle AOM = 60^\circ$: A կետից MON անկյան կիսորդին տարված է ուղղահայաց հարթություն, որը OM և ON ճառագայթները հատում է համապատասխանաբար C և B կետերում: H -ը BC -ի միջնակետն է:

64

Ցի՞շտ են արդյոք հետևյալ պնդումները:

1. ABC -ն կանոնավոր եռանկյուն է:

2. $AH > OH$:

3. OAB եռանկյունը կանոնավոր է:

4. H -ը $OABC$ բուրգին արտագծած գնդային մակերևույթի կենտրոնն է:

5. $AOBC$ երկնիստ անկյունը 45° է:

6. OHB եռանկյունը հավասարասրուն է:

XIX. Տրված է՝ a պարամետրով $(x-a)^2(\sqrt{x}+a-2) \leq 0$ անհավասարությունը:

65 Ճիշտ են արդյոք հետևյալ պնդումները:

1. a պարամետրի ցանկացած արժեքի դեպքում անհավասարությունը ունի ամբողջ լուծում:
2. Եթե $a \in (1; 2)$, ապա անհավասարման լուծումների քազմությունը $[0; (2-a)^2]$ հատվածն է:
3. $a \in (0; 1)$ դեպքում անհավասարությունը ունի առնվազն երկու ամբողջ լուծում:
4. $a > 2$ դեպքում անհավասարությունը ունի միակ լուծում:
5. Եթե $a \in (2-\sqrt{5}; 0)$, ապա անհավասարությունը ունի ճիշտ հինգ ամբողջ լուծում:
6. $a = 2$ դեպքում անհավասարությունը ունի միակ լուծում: