

ՍԻԱՄՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

2020

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

ԹԵՍ 3

Խմբի համարը

Նստարանի համարը

Հարգելի՝ դիմորդ

Խորհուրդ ենք տալիս առաջադրանքները կատարել ըստ հերթականության: Ուշադիր կարդացե՛ք յուրաքանչյուր առաջադրանք և պատասխանների առաջարկվող տարրերակները: Եթե Ձեզ չի հաջողվում որևէ առաջադրանքի անմիջապես պատասխանել, ժամանակը խնայելու նպատակով կարող եք այն բաց թողնել և դրան անդրադառնալ ավելի ուշ:

Ձեր առջև դրված թեստ-գրքույթի էջերի դատարկ մասերը ազատորեն կարող եք օգտագործել սևագլության համար: **Թեստ-գրքույթը չի ստուգվում: Ստուգվում է միայն պատասխանների ճևաքուղը:**

Առաջադրանքները կատարելուց հետո չմոռանաք պատասխանները ուշադիր և խնամքով նշել պատասխանների ճևաքուղը: Պատասխանների ճևաքուղի ճիշտ լրացումից է կախված Ձեր քննական միավորը:

Մաղթում ենք հաջողություն:

Ա մակարդակ

I. Կատարել առաջադիմությունները.

1 Թվի n° մասն է նրա 75%-ը:

- 1) $\frac{4}{5}$
- 2) $\frac{1}{4}$
- 3) $\frac{3}{5}$
- 4) $\frac{3}{4}$

2 Գտնել 15-ից փոքր պարզ թվերի քանակը:

- 1) 8
- 2) 5
- 3) 6
- 4) 7

3 Գտնել 20-ի զույգ բնական բաժանարարների քանակը:

- 1) 6
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

4 Գտնել $\frac{1}{4}$ և $\frac{2}{5}$ թվերի գումարի հակադարձ թիվը:

- 1) $-\frac{3}{20}$
- 2) $\frac{20}{13}$
- 3) $-\frac{13}{20}$
- 4) $\frac{20}{3}$

II. Գտնել արտահայտության արժեքը.

5 $\left(\frac{13}{50}\right)^{-1} + \frac{2}{13} :$

- 1) $\frac{581}{650}$
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 6

6 $5^{-\frac{2}{3}} \cdot \sqrt[3]{25}$

- 1) $\sqrt[3]{5}$
- 2) $\frac{1}{5}$
- 3) 1
- 4) 5

7 $1 - 2 \sin^2 22,5^\circ :$

- 1) 1
- 2) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- 3) $\frac{1}{2}$
- 4) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

8 $\log_{0,2} \frac{1}{125} :$

- 1) 2
- 2) 1
- 3) $\frac{1}{2}$
- 4) 3

III. Կատարել առաջադրանքները.

9

Գտնել $x^2 + 7x - 1 = 0$ հավասարման արմատների գումարը:

- 1) 3,5
- 2) -1
- 3) 7
- 4) -7

10

Գտնել $\sqrt{3x-5} = 7$ հավասարման արմատը:

- 1) \emptyset
- 2) $\frac{5}{3}$
- 3) 18
- 4) -18

11

Գտնել $7^{4x-10} = 1$ հավասարման արմատը:

- 1) 2,5
- 2) $\frac{11}{4}$
- 3) -2,5
- 4) 3

12

Գտնել $\operatorname{tg}\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$ հավասարման արմատները:

- 1) $\frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
- 2) $-\frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
- 3) $\pi k, k \in \mathbb{Z}$
- 4) $2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

IV. Կատարել առաջադրանքները.

13 Լուծել $\frac{x+1}{2} \geq 0$ անհավասարումը:

- 1) $(-1; +\infty)$
- 2) $[1; +\infty)$
- 3) $(-\infty; -1]$
- 4) $[-1; +\infty)$

14 Գտնել $x^2 < 20$ անհավասարմանը բավարարող ամբողջ թվերի քանակը:

- 1) 8
- 2) 5
- 3) 4
- 4) 9

15 Լուծել $3^{x-5} > 27$ անհավասարումը:

- 1) $(-\infty; 8)$
- 2) $[8; +\infty)$
- 3) $(8; +\infty)$
- 4) $(3; +\infty)$

16 Լուծել $\log_5(2x-7) \geq 1$ անհավասարումը:

- 1) $[6; +\infty)$
- 2) $(6; +\infty)$
- 3) $(3,5; +\infty)$
- 4) $(12; +\infty)$

V. Առաջին պահեստում կա 240 տ քարածուխ, իսկ երկրորդում՝ 252 տ: Առաջինից օրական բաց թողեցին 16 տ քարածուխ, իսկ երկրորդից՝ 18 տ:

17 4 օր հետո քանի՞՝ տոննա քարածուխ կմնա երկու պահեստում միասին:

- 1) 324
- 2) 356
- 3) 416
- 4) 312

18 Երկրորդ պահեստի քարածուխը քանի՞՝ օր հետո կսպառվի:

- 1) 16
- 2) 15
- 3) 14
- 4) 13

19 Պահեստներում քանի՞՝ օր հետո կմնա հավասար քանակով քարածուխ:

- 1) 9
- 2) 8
- 3) 7
- 4) 6

20 Քանի՞՝ տոննա քարածուխ կմնա պահեստներից մեկում այն պահին, եթե մյուս պահեստի քարածուխը սպառվի:

- 1) 17
- 2) 18
- 3) 15
- 4) 16

VI. Տրված են $A(1;2;-1)$, $B(2;3;1)$ և $C(3;1;0)$ կետերը:

21 Տրված կետերից ո՞րն է պատկանում Oxy հարթությանը.

- 1) n_2 մեկը
- 2) A
- 3) B
- 4) C

22 Գտնել \overrightarrow{AB} վեկտորի կոորդինատները:

- 1) $\{6;2;0\}$
- 2) $\{1;1;2\}$
- 3) $\{-1;-1;-2\}$
- 4) $\{5;2;-2\}$

23 Գտնել \overrightarrow{AB} և \overrightarrow{AC} վեկտորների սկալյար արտադրյալը:

- 1) 6
- 2) 0
- 3) 3
- 4) 4

24 Գտնել \overrightarrow{AB} և \overrightarrow{AC} վեկտորների կազմած անկյան աստիճանային չափը:

- 1) 90°
- 2) 30°
- 3) 45°
- 4) 60°

VII. Տրված է $f(x) = x^3 - 3x + 6$ ֆունկցիան:

25

Գտնել f ֆունկցիայի ածանցյալը $x=0$ կետում:

- 1) 3
- 2) 0
- 3) -1
- 4) -3

26

Գտնել f ֆունկցիայի կրիտիկական կետերից մեծագույնը:

- 1) 0
- 2) 3
- 3) 1
- 4) -1

27

Գտնել f ֆունկցիայի գրաֆիկի $A(1;4)$ կետում տարված շոշափողի հավասարումը:

- 1) $y = 4$
- 2) $y = x$
- 3) $y = 0$
- 4) $y = x - 2$

28

Գտնել f ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը $[0;2]$ միջակայքում:

- 1) 4
- 2) -4
- 3) 6
- 4) 8

VIII. ABC եռանկյան մեջ $AB = 6$, $BC = 8$ և $AC = 6$:

29 Գտնել եռանկյան պարագիծը:

- 1) 10
- 2) 20
- 3) 21
- 4) $8\sqrt{5}$

30 Գտնել եռանկյան մակերեսը:

- 1) $7\sqrt{5}$
- 2) 24
- 3) $8\sqrt{5}$
- 4) $6\sqrt{5}$

31 Գտնել եռանկյան մեծ միջին զծի երկարությունը:

- 1) 6
- 2) 4
- 3) 3
- 4) $\sqrt{10}$

32 Գտնել CD հատվածի երկարությունը, եթե AD -ն ABC եռանկյան A անկյան կիսորդն է:

- 1) $\frac{24}{7}$
- 2) $\frac{18}{7}$
- 3) 4
- 4) 3

IX. Գլանի առանցքային հատույթը՝ $10\sqrt{2}$ անկյունագծով քառակուսի է:

33

Գտնել գլանի առանցքային հատույթի անկյունագծի և հիմքի հարթության կազմաձ անկյունը:

- 1) 90°
- 2) 30°
- 3) 45°
- 4) 60°

34

Գտնել գլանի հիմքի շառավղի երկարությունը:

- 1) 5
- 2) 10
- 3) $10\sqrt{2}$
- 4) $5\sqrt{2}$

35

Գտնել գլանի կողմնային մակերևույթի մակերեսը:

- 1) 10π
- 2) 50π
- 3) 100π
- 4) 25

36

Գտնել գլանի ծավալը:

- 1) $50\pi^2$
- 2) 250π
- 3) 100π
- 4) 100

X. a, b, c հաջորդականությունը 6 հայտարարով երկրաչափական պրոզրեսիա է, ընդ որում
 $a+b+c=172$:

37 Քանի՞ անգամ է b -ն մեծ a -ից:

38 Գտնել a -ն:

39 x -ի ի՞նչ արժեքի դեպքում $a, b+x, c$ հաջորդականությունը կլինի թվաբանական պրոզրեսիա:

40 b և c թվերի միջև քանի՞ թիվ պետք է գրել, որպեսզի a, b, \dots, c հաջորդականությունը լինի թվաբանական պրոզրեսիա:

XI. Տրված է $\begin{cases} x^2 - 4x + 3 = 0 \\ 2x + 3 \geq a \end{cases}$ համակարգը, որտեղ a -ն պարամետր է:

41 Գտնել ամենափոքր a ամբողջ թիվը, որի դեպքում համակարգը լուծում չունի:

42 Գտնել բոլոր a ամբողջ թվերի գումարը, որոնց դեպքում համակարգը ունի միակ լուծում:

43 Գտնել ամենամեծ a ամբողջ թիվը, որի դեպքում համակարգն ունի ճիշտ երկու լուծում:

44 Գտնել ամենամեծ a ամբողջ թիվը, որի դեպքում համակարգն ունի լուծում:

XII. Տրված է $f(x) = 8\cos^2 x - 8\sin x \cos x$ ֆունկցիան:

45

ճիշտ են արդյոք հետևյալ պնդումները:

1) $f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) - f(x)$ արտահայտության արժեքը կախված չէ x -ից:

2) π թիվը $f(x)$ ֆունկցիայի պարբերություն է:

3) Եթե $x \in \left(\pi; \frac{7\pi}{4}\right)$, ապա $f(x) > 0$:

4) $\left[-2\pi; \frac{\pi}{4}\right]$ միջակայքում $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկն արսցիսների առանցքը հատում է ճիշտ հինգ կետում:

5) $f(x)$ ֆունկցիան ներկայացվում է նաև $f(x) = 4\sqrt{2} \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) + 4$ տեսքով:

6) $f(x)$ ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը պարունակում է ճիշտ 11 ամբողջ թիվ:

Բ մակարդակ

XIII. 180 հա մակերեսով դաշտը վարելու համար 3 օր աշխատեց միևնույն հզորությամբ տրակտորների մի բրիգադ: Այնուհետև նրանց միացավ նույն հզորությամբ մի տրակտոր, որի շնորհիվ բրիգադի արտադրողականությունը մեծացավ 12,5 %-ով, և աշխատելով ևս 4 օր նրանք ավարտեցին աշխատանքը:

46 Աշխատանքի սկզբում քանի՞ տրակտոր էր աշխատում:

47 Մի տրակտորն օրական քանի՞ հեկտար էր վարում:

48 Առաջին երեք օրվա ընթացքում դաշտի ո՞ր տոկոսը վարեց բրիգադը:

49 Առաջին չորս օրվա ընթացքում քանի՞ հեկտար վարեց բրիգադը:

XIV. N -ը և M -ը $ABCD$ զուգահեռագծի համապատասխանաբար CD և BC կողմերի միջնակետերն են, $AN = 7,5\sqrt{2}$, $AM = 15$, $\angle NAM = 45^\circ$:

50 Գտնել AMN անկյան աստիճանային չափը:

51 Գտնել BD անկյունագծի երկարության քառակուսին:

52 Գտնել AD ի երկարությունը:

53 Գտնել ANM և NMC եռանկյունների մակերեսների հարաբերությունը:

XV. Գտնել արտահայտության արժեքը.

$$54 \quad a^4 + \frac{1}{a^4}, \text{ եթե } a - \frac{1}{a} = 4:$$

$$55 \quad \frac{2}{\sqrt{5}-1} + \frac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{9}+\sqrt{7}}:$$

$$56 \quad 18 \cos(2 \arccos \sqrt{17}):$$

$$57 \quad \sqrt{8 \lg 4 + \lg^2 25} + \sqrt{4 \lg 2,5 + \lg^2 4}:$$

XVI. Տրված է $f(x) = \log_7 \sqrt{49 - x^2} + \frac{14}{2 + |x|}$ ֆունկցիան:

58 Գտնել f ֆունկցիայի որոշման տիրույթին չպատկանող ամենափոքր թվականը:

59 Գտնել f ֆունկցիայի նվազման միջակայքին պատկանող ամբողջ թվերի միջին թվաբանականը:

60 Գտնել f ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը:

61 Գտնել այն k ամբողջ թվերի քանակը, որոնց դեպքում $f(k) < f(3)$:

XVII. Կատարել առաջադրանքները.

62

Գտնել 8-ից փոքր թվանշաններով կազմված բոլոր այն քառանիշ թվերի քանակը, որոնցից յուրաքանչյուրի թվանշանները դասավորված են (ձախից աջ) նվազման կարգով:

63

Գտնել 2-ից մեծ թվանշաններով կազմված բոլոր այն եռանիշ թվերի քանակը, որոնցից յուրաքանչյուրում հարևան (կողք-կողքի) թվանշանները տարրեր են:

XVIII. Տրված է $\sqrt{81-x^2} = a - 2|x|$ հավասարումը (a -ն պարամետր է):

64

Ծի՞շտ են արդյոք հետևյալ պնդումները:

- 1) Հավասարման ԹԱՔ-ը պարունակում է ճիշտ 19 ամբողջ թիվ:
- 2) Գոյություն չունի a -ի այնպիսի արժեք, որի դեպքում հավասարումն ունենա ճիշտ մեկ արմատ:
- 3) $a > 20$ պայմանին բավարարող ցանկացած a -ի դեպքում հավասարումն արմատ չունի:
- 4) Գոյություն ունի a -ի միայն երեք ամբողջ արժեք, որոնցից յուրաքանչյուրի դեպքում հավասարումն ունի չորս արմատ:
- 5) $9 < a < 18$ պայմանին բավարարող ցանկացած a -ի դեպքում հավասարումն ունի ճիշտ երկու արմատ:
- 6) Հավասարումն ունի ճիշտ երեք արմատ a -ի միայն մեկ արժեքի դեպքում:

XIX. $ABCA_1B_1C_1$ ուղիղ եռանկյուն պրիզմայի հիմքը ուղղանկյուն եռանկյուն է, որի ներքնածիգը՝ $AB=4$, և $\angle B=15^\circ$: Պրիզմայի ամենամեծ մակերես ունեցող կողմնային նիստը քառակուսի է:

65

Ծի՞շտ են արդյոք հետևյալ պնդումները:

- 1) Պրիզմայի ծավալը 8 է:
- 2) B_1ACA_1 երկնիստ անկյան մեծությունը փոքր է 45° -ից:
- 3) Պրիզմայի կողմնային մակերևույթի մակերեսը փոքր է 34-ից:
- 4) CC_1 և AB_1 ուղիղների հեռավորությունը հավասար է 1-ի:
- 5) Պրիզմային արտագծած գնդային մակերևույթի շառավիղը $2\sqrt{3}$ է:
- 6) Պրիզմային հնարավոր է ներգծել գնդային մակերևույթ: