

ՄԻԱՄՆԱԿԱՆ ՔՆՍՈՒԹՅՈՒՆ

2021

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

ԹԵՍ 3

Խմբի համարը

Նստարանի համարը

Հարգելի՝ դիմորդ

Խորհուրդ ենք տալիս առաջադրանքները կատարել ըստ հերթականության: Ուշադիր կարդացե՛ք յուրաքանչյուր առաջադրանք և պատասխանների առաջարկվող տարբերակները: Եթե Զեզ չի հաջողվում որևէ առաջադրանքի անմիջապես պատասխանել, ժամանակը խնայելու նպատակով կարող եք այն բաց թողնել և դրան անդրադառնալ ավելի ուշ:

Զեր առջև դրված թեստ-զրույկի էջերի դատարկ մասերը ազատորեն կարող եք օգտագործել սևագրության համար: **Թեստ-զրույկը չի ստուգվում: Ստուգվում է միայն պատասխանների ձևաթուղթը:**

Առաջադրանքները կատարելուց հետո չմոռանաք պատասխանները ուշադիր և խնամքով նշել պատասխանների ձևաթուղթում: Պատասխանների ձևաթուղթի ճիշտ լրացումից է կախված Զեր քննական միավորը:

Մաղթում ենք հաջողություն:

Ա մակարդակ

(1-4) Կատարել առաջադրանքները.

1 Ո՞ր թիվը կստանանք, եթե 16-ը մեծացնենք 25% -ով:

- 1) 30
- 2) 20
- 3) 12
- 4) 24

2 Գտնել այն թիվը, որի $\frac{2}{3}$ մասը հավասար է 18-ի:

- 1) 36
- 2) 12
- 3) 21
- 4) 27

3 12-ի բազմապատիկ քանի^շ երկնիշ թիվ կա:

- 1) 8
- 2) 5
- 3) 6
- 4) 7

4 Ի՞նչ մնացորդ կստացվի 45-ը 7-ի բաժանելիս:

- 1) 6
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

(5-8) Գտնել արտահայտության արժեքը.

5 $\left(5\frac{1}{4} - 0,5\right) : \frac{19}{4}$

- 1) $2\frac{1}{8}$
- 2) 1
- 3) 1.5
- 4) 2

6 $(2\sqrt{5} - 3)(2\sqrt{5} + 3)$

- 1) 11
- 2) 10
- 3) 20
- 4) $4\sqrt{5}$

7 $\sqrt{2} \sin 45^\circ + \cos 180^\circ - 2 \sin 270^\circ$

- 1) 3
- 2) 1
- 3) $2\sqrt{2} + 2$
- 4) 2

8 $\log_6 3 + \log_6 2$

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 12
- 4) $\log_6 5$

(9-12) Լուծել հավասարումը.

9 $2x(x-1)=3(x-1)$

- 1) 1 և 1,5
- 2) 1,5
- 3) 1
- 4) 1 և 3,5

10 $\sqrt{3x-9}=2$

- 1) $\frac{13}{3}$
- 2) \emptyset
- 3) 13
- 4) 4

11 $\log_5(5-3x)=2$

- 1) $-\frac{20}{3}$
- 2) $\frac{22}{3}$
- 3) -6,66
- 4) $\frac{20}{3}$

12 $2(\cos x-1)=0$

- 1) $\pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
- 2) $\pm \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
- 3) $2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
- 4) $\pi + \pi k, k \in \mathbb{Z}$

(13-16) Գտնել անհավասարման ամենափոքր ամրող լուծումը.

13 $x^2 < -6x$

- 1) -5
- 2) 0
- 3) 1
- 4) -6

14 $|7-3x| \leq 10$

- 1) -1
- 2) 0
- 3) -2
- 4) -4

15 $\log_{0.1}(x-7) > -1$

- 1) 19
- 2) 9
- 3) 7
- 4) 8

16 $\frac{x^2 - 50}{\sqrt{x+5}} < 0$

- 1) -3
- 2) 0
- 3) -7
- 4) -4

(17-20) Ավտոմեքենան ճանապարհի առաջին կեսն անցավ 72 կմ/ժ արագությամբ, իսկ երկրորդ կեսը՝ 90 կմ/ժ արագությամբ: Ամբողջ ճանապարհը մեքենան անցնում է 9 ժամում:

17

Ճանապարհի առաջին կեսն անցնելու արագությունը քանի^շ տոկոսվ է փոքր երկրորդ կեսն անցնելու արագությունից:

- 1) 25
- 2) 11
- 3) 20
- 4) 10

18

Ճանապարհի երկրորդ կեսն անցնելիս վայրկյանում քանի^շ մետր էր անցնում մեքենան:

- 1) 25
- 2) 1500
- 3) 190
- 4) 20

19

Որքա՞ն է ճանապարհի երկարությունը:

- 1) 900 մ
- 2) 900 կմ
- 3) 1800 մ
- 4) 720 կմ

20

Քանի^շ կմ/ժ էր մեքենայի սիցին արագությունն ամբողջ ճանապարհին:

- 1) 80
- 2) 95
- 3) 10
- 4) 81

(21-24) Կատարել առաջադրանքները.

21

Գտնել (a_n) թվաբանական պրոգրեսիայի այն անդամի համարը, որը հավասար է 92-ի, եթե $a_1 = 15$, $d = 7$:

- 1) 11
- 2) 12
- 3) 13
- 4) 14

22

Գտնել (a_n) թվաբանական պրոգրեսիայի 95-ից փոքր անդամների գումարը, եթե $a_1 = 15$, $d = 7$:

- 1) 847
- 2) 579
- 3) 642
- 4) 741

23

(b_n) երկրաչափական պրոգրեսիայում՝ $b_5 + 4b_3 = -4b_4$: Գտնել պրոգրեսիայի հայտարարը:

- 1) 4
- 2) -2
- 3) 2
- 4) 0

24

Գտնել $6; 2; \dots$ անվերջ նվազող երկրաչափական պրոգրեսիայի գումարը:

- 1) 9
- 2) 1,5
- 3) 4
- 4) 4,5

(25-28) Տրված է $f(x) = \sin x + 1$ ֆունկցիան:

25 Գտնել f ֆունկցիայի ածանցյալը:

- 1) $-\sin x$
- 2) $-\cos x$
- 3) $-\cos x + 1$
- 4) $\cos x$

26 Գտնել f ֆունկցիայի զրաֆիլի և $y=1,5$ ուղղի հատման կետերի արագիսները:

- 1) $(-1)^k \cdot \frac{\pi}{6} + \pi k; k \in Z$
- 2) $\frac{\pi}{6}$
- 3) $\frac{\pi}{6} + \pi k; k \in Z$
- 4) $(-1)^k \cdot \frac{\pi}{3} + 2\pi k; k \in Z$

27 Գտնել f ֆունկցիայի փոքրագույն արժեքը:

- 1) ξ
- 2) 1
- 3) -1
- 4) 0

28 Հետևյալ թվերից ո՞րն է f ֆունկցիայի պարբերություն.

- 1) 4π
- 2) π
- 3) 3π
- 4) 2

(29-32) $ABCD$ զուգահեռազօծի մեջ $AB = 2$, $BC = 7$, $\angle A = 30^\circ$:

29 Գտնել զուգահեռազօծի B անկյան աստիճանային չափը:

- 1) 150°
- 2) 60°
- 3) 90°
- 4) 120°

30 Գտնել զուգահեռազօծի պարագիծը:

- 1) 22
- 2) 9
- 3) 11
- 4) 18

31 Գտնել զուգահեռազօծի AD կողմին տարված բարձրության երկարությունը:

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

32 Գտնել զուգահեռազօծի մակերեսը:

- 1) 28
- 2) 7
- 3) 14
- 4) 22

(33-36) Կոնի բարձրությունը 12 է, իսկ հիմքի տրամագիծը՝ 10:

33 Գտնել կոնի ծնորդը:

- 1) 17
- 2) 13
- 3) $2\sqrt{34}$
- 4) 15

34 Գտնել կոնի ծավալը:

- 1) 300π
- 2) 65π
- 3) 120π
- 4) 100π

35 Գտնել կոնի առանցքային հատույթի մակերեսը:

- 1) 60
- 2) 120
- 3) 40
- 4) 6

36 Գտնել կոնի կողմնային մակերևույթի մակերեսը:

- 1) 90π
- 2) 60π
- 3) 65π
- 4) 156π

(37-40) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ վեկտորները զույգ առ զույգ փոխուղղահայաց են և նրանց երկարությունները համապատասխանաբար հավասար են 6; 12 և 8:

37

Գտնել \vec{c} և \vec{a} վեկտորների տարբերության երկարությունը:

38

Գտնել $\vec{c} - \vec{a}$ և $\vec{c} + \vec{a}$ վեկտորների սկալյար արտադրյալը:

39

Գտնել \vec{a} և $\vec{b} - 2\vec{a}$ վեկտորների կազմած անկյան աստիճանային չափը:

40

Գտնել $\vec{a} + 2\vec{b} + \vec{c}$ վեկտորի երկարությունը:

$$(41-44) \text{ Տրված է } \sqrt{\frac{x-1}{6\pi-x}} \cdot \left(\sin \frac{\pi x}{2} + \operatorname{tg} \frac{\pi x}{4} \right) = 0 \text{ հավասարումը:}$$

41 Քանի՞ ամբողջ թիվ է պարունակում հավասարման ձախ մասի արտահայտության առաջին արտադրիչի ԹԱԲ-ը:

42 Քանի՞ ամբողջ թիվ է պարունակում հավասարման ԹԱԲ-ը:

43 Ω° թիվ է հավասարման ամենափոքր ամբողջ արմատը:

44 Քանի՞ ամբողջ արմատ ունի հավասարումը:

45

Տրված է $f(x) = e^x(x^2 - x - 1)$ ֆունկցիան:

Այլ շատ են արդյոք հետևյալ պնդումները:

- 1) f ֆունկցիայի գրաֆիկը կոորդինատային առանցքները հատում է ճիշտ երկու կետում:
- 2) f ֆունկցիայի գրաֆիկն և $y = -e$ ուղիղն ունեն ճիշտ երկու ընդհանուր կետ:
- 3) f ֆունկցիան ունի ճիշտ մեկ կրիտիկական կետ:
- 4) f ֆունկցիայի գրաֆիկի $x=0$ աբսցիսով կետում տարված շոշափողը Ox առանցքի հետ կազմում է 120° -ից փոքր անկյուն:
- 5) f ֆունկցիան $[-2; 1]$ միջակայքում նվազող է:
- 6) $f\left(\cos \frac{\pi}{10}\right) < f\left(\cos \frac{\pi}{9}\right)$

Բ մակարդակ

- (46-49) Գրքի էջերի քանակն արտահայտվում է նուանիշ թվով և հավասար է էջերը համարակալելու համար օգտագործված թվանշանների քանակի 35 %-ին (համարակալումը սկսվում է 1 թվանշանից):

- 46** Քանի՞ թվանշան է օգտագործվել գրքի առաջին 90 էջը համարակալելու համար:
- 47** Քանի՞ էջ է համարակալվել, եթե արդեն օգտագործվել է 360 նիշ:
- 48** Քանի՞ էջ ունի այդ գիրքը:
- 49** Քանի՞ անգամ է 7 թվանշան զրվել այդ գրքի էջերը համարակալելիս:

- (50-53) $ABCD A_1B_1C_1D_1$ զուգահեռանիստի բոլոր նիստերը $6\sqrt{3}$ և $8\sqrt{3}$ երկարությամբ անկյունագծերով շեղանկյուններ են, իսկ A գագաթի հարք անկյունները սուր են:

50 Գտնել զուգահեռանիստի կողմնային մակերևույթի մակերեսը:

51 Գտնել BB_1D_1D հատույթի մակերեսը:

52 Գտնել $ABCD$ հիմքի վրա AA_1 կողի պրոյեկցիայի երկարության քառապատիկի քառակուսին:

53 Գտնել $\frac{V}{\sqrt{13}}$ հարաբերության թվային արժեքը, որտեղ V -ն զուգահեռանիստի ծավալն է:

(54-57) Գտնել արտահայտության արժեքը.


54 $\frac{a+3}{a-1} - \frac{b+3}{b-1}$, եթե $2b-ab=1$ ($a \neq 1, b \neq 1$)

55 $\sqrt{28+16\sqrt{3}} - \sqrt{21-12\sqrt{3}}$

56 $10 \cdot \sin 2\alpha$, եթե $\sin a - \cos a = \sqrt{0,4}$

57 $\log_{\sqrt{1,5}}(27-9\sqrt{6}) - \log_{\sqrt{1,5}}(4\sqrt{6}-8)$

(58-61) Տրված է $D(f) = [-7; 3]$ որոշման տիրույթով f ֆունկցիայի գրաֆիկը:



58

Գտնել $f(f(2)) + f(f(3))$ արտահայտության արժեքը:

59

Գտնել $f'(-5) \cdot f(x) \geq f'(-2)$ անհավասարման ամբողջ լուծումների քանակը:

60

Գտնել $f \circ f$ ֆունկցիայի որոշման տիրույթին պատկանող ամբողջ թվերի քանակը:

61

Գտնել $f \circ f$ ֆունկցիայի արժեքների տիրույթին պատկանող ամբողջ թվերի գումարը:

(62-63) Կատարել առաջադրանքները.

62

Չկրկնվող թվանշաններով բոլոր այն հնգանիշ թվերը, որոնք կարելի է կազմել 1, 2, 3, 4, 5 թվանշաններով, համարակալված են աճման կարգով: Ո՞ր համարն է կրում 54213 թիվը:

63

Քանի՞ եղանակով է հնարավոր 7 մարդուց ընտրել 3 զույգ:

64

Տրված է՝ a պարամետրով $(x-a)^2(\sqrt{x}+a-2) \leq 0$ անհավասարումը:

Շի՞շտ են արդյոք հետևյալ պնդումները:

- 1) $a = 2$ դեպքում անհավասարումն ունի միակ լուծում:
- 2) $a > 2$ դեպքում անհավասարումը ունի միակ լուծում:
- 3) a պարամետրի ցանկացած արժեքի դեպքում անհավասարումն ունի ամբողջ լուծում:
- 4) Եթե $a \in (1; 2)$, ապա անհավասարման լուծումների բազմությունը $\left[0; (2-a)^2\right]$ հատվածն է:
- 5) Եթե $a \in (2 - \sqrt{5}; 0)$, ապա անհավասարումն ունի ճիշտ չորս ամբողջ լուծում:
- 6) $a \in (0; 0,5)$ դեպքում անհավասարումն ունի առնվազն երեք ամբողջ լուծում:

65

ABCD հավասարասրուն սեղանի AC անկյունագիծն ուղղահայաց է CD սրունքին և BE բարձրությունը բաժանում է $BF = 8$ և $EF = 1$ երկարությամբ հատվածների:

Շի՞շտ են արդյոք հետևյալ պնդումները:

- 1) ABF եռանկյան և CEF եռանկյան մակերեսները հավասար են:
- 2) $AB : AC = 1 : 4$
- 3) $\Delta AFE \sim \Delta ABE$
- 4) $FO > OC$, որտեղ O -ն $ABCD$ սեղանի անկյունագծերի հատման կետն է:
- 5) $S_{ABF} : S_{BCE} = 1 : 9$
- 6) ABC եռանկյանն արտագծած շրջանագծի շառավիղը 15 է: