

# ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

2025

ՀՈՒՂԻՄ

## ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԵՍ 2

Խմբի համարը

Նստարանի համարը

Հարգելի՝ դիմորդ

Խորհուրդ ենք տալիս առաջադրանքները կատարել ըստ հերթականության: Ուշադիր կարդացե՛ք յուրաքանչյուր առաջադրանք և պատասխանների առաջարկվող տարբերակները: Եթե Զեզ չի հաջողվում որևէ առաջադրանքի անմիջապես պատասխանել, ժամանակը խնայելու նպատակով կարող եք այն բաց թողնել և դրան անդրադառնալ ավելի ուշ:

Զեր առջև դրված թեստ-գրքույկի էջերի դատարկ մասերը ազատորեն կարող եք օգտագործել սևագրության համար: **Թեստ-գրքույկը չի ստուգվում: Ստուգվում է միայն պատասխանների ճևաքուղքը:**

Առաջադրանքները կատարելուց հետո չմոռանաք պատասխանները ուշադիր և խնամքով նշել պատասխանների ճևաքուղքը: Պատասխանների ճևաքուղքի ճիշտ լրացումից է կախված Զեր քննական միավորը:

Մաղթում ենք հաջողություն:

1

Ո՞ր բույսն ունի առանցքային արմատային համակարգ.

- 1) եղիպտացորենը
- 2) սոխը
- 3) ձմերուկը
- 4) մորին

2

Հետևյալ օրգանիզմներից ո՞րն է պատկանում նախակորիզավորների վերնաբազավորությանը.

- 1) պլարուկուկը
- 2) բալանտիդիումը
- 3) անաբենան
- 4) քլամիդոննաղը

3

Ո՞ր միջատներն են զարգանում լրիվ կերպարանափոխությամբ.

- 1) մրջյունները
- 2) խավարասերները
- 3) մորեխները
- 4) ծղրիդները

4

Թվարկված կենդանիներից ո՞րն է պատկանում կլոր որդերի տիպին.

- 1) եզան երիզորդը
- 2) սրատուտը
- 3) էխինոկուլը
- 4) խոզի երիզորդը

5

Մողեսի ողնաշարի ո՞ր բաժնի ողերն են կրում կողեր.

- 1) գոտկային, սրբանային, պոչային
- 2) սրբանային և պոչային
- 3) կրծքային և գոտկային
- 4) պարանոցային և կրծքային

6

Ո՞ր օրգաններն են մասնակցում սեռահասուն գորտերի շնչառությանը.

- 1) խոհիկները և տրախեաները
- 2) բոքերը և մաշկը
- 3) խոհիկները և բոքերը
- 4) տրախեաները և մաշկը

7

Ո՞ր հորմոններն են բարձրացնում զյուկողի քանակն արյան մեջ.

- 1) թիրօքսինը և ինսուլինը
- 2) գլյուկագոնը և ադրենալինը
- 3) ինսուլինը և ադրենալինը
- 4) ինսուլինը և գլյուկագոնը

8

Ի՞նչ գործառույթ է իրականացնում բիբը մարդու օրգանիզմում.

- 1) լուսային ազդակի փոխակերպման նյարդային գրգիռի
- 2) գույնի ընկալման
- 3) լույսի ճառագայթների տարրերակման
- 4) լույսի ճառագայթների քանակի կարգավորման

9

Մարդու ո՞ր ուսկորներն են միացած սերտաճման միջոցով.

- 1) վերին և ստորին ծննդաները
- 2) գանգի քունքային և ծոծրակային ոսկրերը
- 3) ողնաշարի սրբանային բաժնի ողերը
- 4) ողնաշարի գոտկային բաժնի ողերը

10

Մարդու օրգանիզմում ինչի՞ միջոցով է տեղի ունենում նյութափոխանակության արգասիքների հեռացումն արյունից.

- 1) միզածորանների
- 2) միզուկի
- 3) նեֆրոնի
- 4) միզապարկի

11

Ո՞ր վիտամինների անբավարարությունն է հանգեցնում մարդու տեսողության վատքարացմանը.

- 1) C և B<sub>1</sub>
- 2) D և B<sub>12</sub>
- 3) C և A
- 4) A և B<sub>2</sub>

12

Մարդու մարսողական համակարգի ո՞ր օրգանում է սկսվում օսլայի մարսումը.

- 1) ստամոքսում
- 2) լայնակի խթաղիում
- 3) բարակ աղիում
- 4) բերանի խոռոչում

13

Ի՞նչ է տեղի ունենում մարդու օրգանիզմում միջավայրում ջերմաստիճանի անկման դեպքում.

- 1) նեղանում են մաշկի մազանոթների լուսածերպերը, նվազում է մարմնի ջերմաստվությունը
- 2) մաշկի արյան անոթները լայնանում են, արյան հոսքը արագանում է, մարմնի ջերմաստվությունը մեծանում է
- 3) ածում է արյան հոսքը դեպի մաշկ, իսկ մարմնի ջերմաստվությունը նվազում է
- 4) լայնանում են մաշկի արյան անոթները և մեծանում է այնտեղ մղվող արյան քանակը

14

Ո՞ր պնդումն է սխալ թրոմբինի վերաբերյալ.

- 1) մասնակցում է արյան մակարդման գործընթացին
- 2) ֆերմենտ է
- 3) ազդում է ֆիբրինոգենի վրա
- 4) թրոմբինի թելիկներից ձևավորվում է թրոմբը

15

Որտե՞ղ է իրականանում զազափոխանակությունը մարդու օրգանիզմի և արտաքին միջավայրի միջև.

- 1) թոքային երակներում
- 2) մանրազույն թրոմիսներում
- 3) թոքաբջերում
- 4) թոքային զարկերակներում

16

**Ինչպե՞ս են միմյանց միանում նուկլեոտիդներն ի-ՈՒՆԹ-ի մոլեկուլում.**

- 1) հարևան նուկլեոտիդների ազոտական հիմքերի միջոցով
- 2) մեկ նուկլեոտիդի ազոտական հիմքի և հարևան նուկլեոտիդի ֆոսֆորական թթվի միջոցով
- 3) մեկ նուկլեոտիդի ազոտական հիմքի և հարևան նուկլեոտիդի ածխաջրի միջոցով
- 4) մեկ նուկլեոտիդի ածխաջրի և հարևան նուկլեոտիդի ֆոսֆորական թթվի միջոցով

17

**Ի՞նչն է կատարում մատրիցայի դեր սպիտակուցի կենսասինթեզի դեպքում.**

- 1) ի-ՈՒՆԹ-ի մոլեկուլը
- 2) ԴՆԹ-ի մոլեկուլը
- 3) ռիբոսոմը, կորիզը
- 4) ԴՆԹ-ի մոլեկուլի շղթաներից մեկը, փ-ՈՒՆԹ-ն, ռ-ՈՒՆԹ-ի մոլեկուլը

18

**Ո՞ր բջիջներում հատիկավոր էնդոպլազմային ցանցը լավ զարգացած չէ.**

- 1) ձվարջիջներում և սաղմնային բջիջներում
- 2) ձվարջիջներում և ենթաստամոքսային գեղձի բջիջներում
- 3) բբագեղձերի և ենթաստամոքսային գեղձի բջիջներում
- 4) սեռական բջիջներում և բբագեղձերի բջիջներում

19

**Թաղանքային կառուցվածք չունեցող օրգանիզմների թվին են պատկանում.**

- 1) ռիբոսոմներն ու բջջային կենտրոնը
- 2) լիզոսոմներն ու վակուոլները
- 3) ռիբոսոմներն ու միտոքոնիլիումները
- 4) Գոլջիի ապարատն ու ռիբոսոմները

20

**Ո՞ր հատկանիշն ունի ռեակցիայի նեղ նորմա.**

- 1) կովերի կաթնատվությունը
- 2) աչքերի գույնը
- 3) սերմերի զանգվածը
- 4) բույսի բարձրությունը

**21** Ո՞ր օրգաններն են առաջանում էնտոդերմից սաղմնային զարգացման ընթացքում.

- 1) աղիների, խոհկների և թոքերի էպիթելլ
- 2) միզածորանները, գլխուղեղը, լսողության օրգանները
- 3) զգայարանները, նյարդերը, թոքերը, մաշկի էպիթելլ
- 4) մկանները, նյարդերը, աղիները, երիկամները

**22** Ե՞րբ են քրոմոսոմները կազմված լինում մեկ քրոմատիդից.

- 1) միտոզի մետաֆազի սկզբում
- 2) ինտերֆազի վերջում
- 3) միտոզի պրոֆազի սկզբում
- 4) միտոզի անաֆազի վերջում

**23** Ո՞րն է անսեռ բազմացման օրինակ.

- 1) հիդրայի բազմացումը բողբոջմամբ
- 2) կուսածնությունը
- 3) կրկնակի բեղմնավորումը
- 4) բույսերի զարգացումը սերմից

**24** Ինչպե՞ս են անվանում տվյալ տեսակին պատկանող օրգանիզմների քրոմոսոմների հապլոիդ հավաքի **ԴՆԹ-ի** մոլեկուլների ամբողջությունը.

- 1) գենոֆոնի
- 2) գենոմ
- 3) գենոտիպ
- 4) ֆենոտիպ

**25** **Գ.Սեմղելի ձևակերպած ո՞ր օրենքն է պնդում, որ առաջին սերմի հիբրիդների խաչասերման կամ ինքնափոշոտման արդյունքում առաջացած առանձնյակների 1/4-ն ունենում է ռեցեսիվ հատկանիշ, 3/4-ը՝ դոմինանտ հատկանիշ.**

- 1) հատկանիշների անկախ բաշխման օրենքը
- 2) ճեղքավորման օրենքը
- 3) միակերպության օրենքը
- 4) գամետների մաքրության օրենքը

**26** **Ի՞նչ է գեների կոմպլեմենտար ազդեցությունը.**

- 1) գերդոմինանտությունը պայմանավորող գույգերի փոխներգործություն
- 2) շղթայակցված գեների փոխներգործություն
- 3) տարրեր անելային գույգերի փոխներգործություն
- 4) միևնույն ալելային գույգի երկու գեների փոխներգործություն

27

Քանի՞ տիպի գամետ կառաջացնի գորշ մարմնով և նորմալ զարգացած թևերով եղ հետերոզիզոտ դրոզոֆիլը, եթե դոմինանտ գեներն իրար են շղթայակցված, իսկ ռեցեսիվները՝ իրար, և հոմոլոգ քրոմոսոմների միջև տրամախաչում չկա:

- 1) ուր
- 2) մեկ
- 3) երկու
- 4) չորս

28

Շղթայակցման բացակայության դեպքում ինչպիսի՞ հարաբերությամբ  $AaBb$ ,  $aaBb$ ,  $Aabb$ ,  $aabb$  գենոտիպով առանձնյակներ կստացվեն, եթե խաչասերվեն  $AaBb$  և  $AaBb$  գենոտիպով առանձնյակներ.

- 1) 9:3:3:1
- 2) 1:2:1
- 3) 1:1:1:1
- 4) 4:2:2:1

29

Ո՞րք համակցական փոփոխականության պատճառ չէ.

- 1) դուպլիկացիայի ժամանակ կարճ նույլեութիղային հատվածների երկարացումը
- 2) մեյօզի առաջին բաժանման պլոֆազում դիտվող քրոմոսոմների հնարավոր տրամախաչումը
- 3) բեղմնավորման ժամանակ գամետների պատահական զուգակցումը
- 4) մեյօզի առաջին բաժանման անաֆազում հոմոլոգ քրոմոսոմների պատահական տարամիտումը

30

Ե՞րբ է սովորաբար առաջանում պոլիպոլիդ քջիզը.

- 1) քջի բաժանման ժամանակ քրոմոսոմների տարամիտման խանգարման արդյունքում
- 2) գենային մուտացիաների արդյունքում
- 3) քրոմոսոմի որևէ հատվածի  $180^{\circ}$  անկյան տակ պտույտի արդյունքում
- 4) քրոմոսոմի մի մասի՝ նրան ոչ հոմոլոգ քրոմոսոմի վրա տեղափոխման արդյունքում

31

Ո՞ր նյութն է կենսահանքային.

- 1) երկնաքարը
- 2) օվկիանոսի ջուրը
- 3) կրային ապարը
- 4) քարածուխը

32

**Միջտեսակային փոխարարերությունների ո՞ր ձևի օրինակ է քարաքոսը.**

- 1) մակարուծության
- 2) մուտուալիզմի
- 3) կոռպերացիայի
- 4) կոմենսալիզմի

33

**Նշվածներից ո՞րն է զուգահեռության արդյունք.**

- 1) կոլիբրիի և իլիկաթիթեոի բերանային ապարատների նմանությունը
- 2) դելֆինների և շնաձկների մարմնի շրջհոսելի ձևը
- 3) կետանմանների և թիառտների վերջույթների նմանությունը
- 4) խլուրդի և իշախառանչ արջուկի վերջույթների նմանությունը

34

**Ինչի՞ արդյունքում կարող է տեղի ունենալ նոր տեսակների առաջացում նախկին արեալի ներսում նույն տեսակի պոպուլյացիաներից.**

- 1) մոդիֆիկացիոն փոփոխականության
- 2) կոնվերգենցիայի
- 3) էկոլոգիական մեկուսացման
- 4) աշխարհագրական մեկուսացման

35

**Ո՞ր օրգանիզմները պրոդրուցենտներ չեն.**

- 1) գլխարկավոր սնկերը
- 2) քեմոսինթեզող բակտերիաները
- 3) նիտրիֆիկացնող բակտերիաները
- 4) կապտականաչ ջրիմուռները

36

**Ի՞նչն է էկոհամակարգի առաջնային արտադրանքը.**

- 1) էկոհամակարգի կենսազանգվածի առաջացման արագությունը
- 2) կոնսումենտների կենսազանգվածի աճը միավոր ժամանակում
- 3) հետերոտրոֆների կենսազանգվածի աճը միավոր ժամանակում
- 4) պրոդրուցենտների կենսազանգվածի աճը միավոր ժամանակում

(37-38) Խաչասերել են աaBBCcDdEeFf x AaBbCCDDeeFf գենոտիպերով առանձնյակներ: Ալելային գեների առաջին երկու զույգերում առկա է լրիվ դոմինանտուրյուն, իսկ վերջին չորսում՝ ոչ լրիվ: Տվյալ հատկանիշները պայմանավորող գեները գտնվում են հոմոլոգ քրոմոսոմների տարբեր զույգերում:

37

Գտնել սերնդում հնարավոր գենոտիպերի թիվը.

- 1) 32
- 2) 48
- 3) 64
- 4) 96

38

Գտնել սերնդում հնարավոր ֆենոտիպերի թիվը.

- 1) 32
- 2) 48
- 3) 24
- 4) 96

(39-40) Ծածկասերմ բույսի առէջներից մեկում առաջացել է 2000000 փոշեհատիկ:

39

**Քանի՞ սպերմիումներ են դրանք պարունակում.**

- 1) 4000000
- 2) 8000000
- 3) 1000000
- 4) 2000000

40

**Քանի՞ վեգետատիվ թղիջ են դրանք պարունակում.**

- 1) 4000000
- 2) 8000000
- 3) 1000000
- 4) 2000000

41

Կենդանու ո՞ր տեսակին (նշված է աջ սյունակում) ո՞ր կառուցվածքային առանձնահատկությունն է համապատասխանում (նշված է ձախ սյունակում): Նշել ճիշտ համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Կառուցվածքային  
առանձնահատկությունը

Կենդանու տեսակը

- A. քլորոպլաստ
- B. երկու կորիգ
- C. ավտոտրոֆ սնուցում
- D. թարթիչների առկայություն
- E. լուսազգայուն աչիկի առկայություն
- F. կեղծ ոսիկներ

- 1. կանաչ էվգլենա
- 2. հողաթափիկ ինֆուզորիա
- 3. սովորական ամերիքա

42

Ո՞ր նյարդային կենտրոնը (նշված է ձախ սյունակում) մարդու կենտրոնական նյարդային համակարգի ո՞ր տեղամասում է (նշված է աջ սյունակում) գտնվում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Նյարդային կենտրոն

Կենտրոնական նյարդային  
համակարգի տեղամաս

- A. հռտառական գոտի
- B. զերմակարգավորման կենտրոն
- C. կմախքային մկաններին ազդակներ ուղարկող գոտի
- D. տեսողական ճանաչողության գոտի
- E. լույսի նկատմամբ կողմնորոշման ռեֆլեքսի կենտրոն
- F. քաղցի և ծարավի զգացողության կենտրոն
- G. ձայնի նկատմամբ կողմնորոշման ռեֆլեքսի կենտրոն

- 1. մեծ կիսագնդերի կեղևի քունքային բիլք
- 2. ենթատեսաթումբ
- 3. մեծ կիսագնդերի կեղևի ծոծրակային բիլք
- 4. միջին ուղեղ
- 5. մեծ կիսագնդերի կեղևի ճակատային բիլք

43

Կրկնակի բեղմնավորման արդյունքում ծաղկավոր բույսի ո՞ր մասից (նշված է ձախ մասում) ի՞նչ է զարգանում (նշված է աջ մասում): Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

- |   |                 |
|---|-----------------|
| A. սաղմնապարկից   | 1. սերմնամաշկը  |
| B. վարսանդի սերմնարանից                                   | 2. պտղապատը     |
| C. սաղմնապարկի պատից                                      | 3. բույսի սաղմը |
| D. կենտրոնական բջջի և սպերմիումներից<br>մեկի միաձուլումից | 4. էնդոսպերմը   |
| E. զիգոսից  | 5. սերմը        |
| F. սերմնարանի պատից                                       | 6. պտուղը       |

44

Ո՞ր օրգանական միացությունը (նշված է ձախ սյունակում) մոլեկուլի ո՞ր կառուցվածքին է (նշված է աջ սյունակում) համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Օրգանական միացություններ

Մոլեկուլի կառուցվածքը

- |             |            |
|-------------|------------|
| A. միոզին   | 1. պոլիմեր |
| B. էրիթրոզ  | 2. մոնոմեր |
| C. ակտին    |            |
| D. մեթիոնին |            |
| E. գլյուկոզ |            |
| F. մանան    |            |
| G. կոլագեն  |            |
| H. ի-ՈՒԹ    |            |

45

Ինչպիսի՞ համապատասխանություն գոյություն ունի էվոլյուցիոն փոփոխությունների (նշված է ձախ սյունակում) և էվոլյուցիայի ուղիների (նշված է աջ սյունակում) միջև։ Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության։

### Էվոլյուցիոն փոփոխություն

- A. բույսերի փոշոտումը քամու միջոցով
- B. գաղճ բույսի տերևների բացակայությունը
- C. տաքարյունության առաջացումը
- D. բույսերում սերմերի առաջացումը
- E. քորդավորների քառախորշ սրտի առաջացումը
- F. ձիերի սմբակների առաջացումը
- G. հավերժական սառույցներում բակտերիաների կենսունակությունը
- H. ժապավենաձև որդերի մարսողական համակարգի հետզարգացումը

### Էվոլյուցիայի ուղիներ

- 1. իդիոադապտացիա
- 2. արոմորֆոզ
- 3. ընդհանուր դեգեներացիա

46

Ինչպիսի՞ն է արյան հաջորդական ուղին ձկների արյունատար համակարգում՝ սկսած սիրտ մտնելու պահից։ Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

- 1. փորոք
- 2. փորային առտա
- 3. դեպի սիրտ տանող երակներ
- 4. մեջքային առտա
- 5. նախասիրտ
- 6. խոիկային թերթիկների մազանոթներ
- 7. ներքին օրգանների մազանոթներ

47

Չոր սնունդ ընդունելիս ինչպիսի՞ն է համի զգացողության ձևավորման գործընթացների հաջորդականությունը մարդու օրգանիզմում։ Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

- 1. թերանի խոռոչի մեխանընկալիչների գրգռում չոր սնունդի հետ շփվելիս
- 2. քիմընկալիչների դրդում
- 3. նյարդային ազդակների հաղորդում մեծ կիսագնդերի կեղև
- 4. թքազատության ուժեղացում
- 5. համի զգայության ձևավորում
- 6. կենտրոնաձիգ նյարդերով նյարդային ազդակների հաղորդում երկարավուն ուղեղ
- 7. սննդի բաղադրիչների լուծում թքում

48

**Ի՞նչ հաջորդական պրոցեսներից է կազմված մարդու շնչառությունը: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը՝ սկսելով ներշնչման պրոցեսի սկզբից.**

1. միջկողային մկանների կծկում
2. կողոսկրերի բարձրացում
3. մթնոլորտային օդի անցում շնչափող
4. կրծքավանդակի ծավալի մեծացում ուղղաձիգ ուղղությամբ
5. գազափոխանակություն թոքերում
6. կրծքավանդակի ծավալի փոքրացում
7. արտաշնչում
8. միջկողային մկանների թուլացում
9. ստոծանու գմբեթների իջեցում

49

**Երկրորդային սեռական հատկանիշի զարգացման ժամանակ ի՞նչ հաջորդականությամբ են մարդու օրգանիզմում տեղի ունենում նշված գործընթացները.**

1. մակուլեղի գործառույթի խթանում
2. կոկորդի և ձայնալարերի աճ
3. արյան մեջ արական սեռական հորմոնի քանակության ավելացում
4. ձայնալարերի տատանման հաճախականության նվազում
5. ենթատեսարմբում նեյրոհորմոնների սինթեզ
6. սերմնարանում հորմոնի սինթեզի խթանում

50

**Ինչպիսի՞ն է պրոցեսների հաջորդականությունը բույսերի օրգանիզմում սպիտակուցի մոլեկուլի առաջացման ժամանակ.**

1. հիդրոֆոր և -S-S- կովալենտ կապերի առաջացում
2. սպիտակուցի տարածական կառուցվածքի առաջացում
3. ջրի և անօրգանական աղերի ներծծում արմատի միջոցով
4. ամինաթթուների միջև ջրածնային կապերի առաջացում
5. ամինաթթուների սինթեզ՝ անօրգանական նյութերից
6. ամինաթթուների միջև պեպտիդային կապերի առաջացում

51

**Ի՞նչ հաջորդականությամբ են տեղի ունենում պրոցեսները՝ բակտերիաֆազով բակտերիայի վարակման ժամանակ: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. բակտերիաֆազի ԴՆԹ-ի սինթեզ
2. բակտերիայի ոչնչացում
3. բակտերիաֆազի ԴՆԹ-ի ներարկում բակտերիայի մեջ
4. պոչային ելունների ամրացում բջջաբաղանքին
5. բակտերիաֆազի սպիտակուցների սինթեզ
6. բջջաբաղանքի «լուծում»
7. նոր բակտերիաֆազերի ձևավորում

52

**Ի՞նչ հաջորդականությամբ են իրականանում սպերմատոզենեզի գործընթացները:**  
**Նշել ճիշտ հերթականությունը.**

1. սպերմատիդների առաջացում
2. կրկնակի քրոմատիդներից կազմված քրոմոսոմների հապլոիդ հավաքակազմով բջիջների առաջացում
3. դիպլոիդ բջիջների բաժանում՝ միտոզով և սկզբնական սեռական բջիջների բվի ավելացում
4. առաջին կարգի սպերմատոցիտների առաջացում
5. սպերմատոզուիդների ձևավորում
6. բջիջների աճ, ԴՆԹ-ի կրկնապատկում
7. կոնյուգացիա և տրամախաչում

53

**Նշել մարդու օրգանիզմի կառուցվածքին կամ այնտեղ իրականացվող գործընթացներին վերաբերող բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. երկարավուն ուղեղի շնչառության կենտրոնում մոտավորապես չորս վայրկյանը մեկ առաջանում են գրգիռներ, որոնք հաղորդվում են միջկողային մկաններին և ստոծանուն
2. կոկորդի ներքին պատը պատված է թարթիչավոր ծածկութային հյուսվածքով
3. վահանաձև գեղձի գերգործառույթի դեպքում զարգանում է կրետինիզմ
4. միջին ականջում ասպանդակը հպվում է կլոր պատուհանի թաղանթին
5. լսողական ընկալիչները գտնվում են կորտյան օրգանում
6. միջին ականջը հեղուկով լցված փոքրիկ խոռոչ է

54

**Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. մողեսի միզածորանները բացվում են կոյանոցի մեջ
2. պուլայ հիդրան հերմաֆրոդիտ է, անբարենպաստ պայմաններում բազմանում է սեռական եղանակով
3. թոշունների թոփքի ժամանակ գազափոխանակությունը տեղի է ունենում բոքերում և օդապարկերում
4. բնակալ թոշունները սովորաբար ավելի շատ ձվեր են դնում, քան բնախույսները
5. կաթնատուններն ունեն առտայի միայն աջ աղեղ, որը դուրս է զալիս ձախ փորոքից
6. բորբոսասնկերը սապրոֆիտ են
7. պտերներն ունեն արմատ, ծաղիկ, տերև, ցողուն

## Նշել բոլոր միջտ պնդումները.

1. բակտերիաներն ունեն քլորովլաստներ, որտեղ քլորոֆիլի փոխարեն հանդիպում է բակտերիոքլորոֆիլը և այլ ֆոտոսինթետիկ գունակներ
2. ջրում ճարպերն առաջացնում են լիպոստմներ, որոնք ջրով լցված լիպիդային երկշերտ կառույցներ են
3. քրոմատինը ԴՆԹ-ի, հիստոնային և ոչ հիստոնային սպիտակուցների համալիր է
4. ԴՆԹ-ի մեկ շղթայում աղենինային նուկլեոտիդի քանակը միշտ հավասար է թիմինային նուկլեոտիդի քանակին
5. քլորոֆիլը հիմնականում կլանում է կանաչ և կապտամանուշակագույն գույները, իսկ կարմիրն անդրադարձնում է, որի պատճառով բույսերը հիմնականում կանաչ գույն ունեն
6. նյութերի տեղափոխությունը բարձր խտությունից դեպի ցածրն, այսինքն ըստ գրադիենտի, կոչվում է պասիվ փոխադրում, և այն արտաքին էներգիայի ծախս չի պահանջում

## Նշել մարդու օրգանիզմի կառուցվածքին կամ այնտեղ իրականացվող գործընթացներին վերաբերող բոլոր սխալ պնդումները.

1. թքում պարունակվող անօրգանական նյութերից են իմունոգլոբուլինները, լիզոցիմը, ինտերֆերոնը
2. ճարպերը մասնակցում են մարդու մակերիկամների հորմոնների կենսասինթեզին
3. մակերիկամի կեղևային շերտի հորմոն աղբենափնը բարձրացնում է արյան ճնշումը, նպաստում է արյան մեջ զյուկոզի առաջացմանը
4. ենթամաշկային բջջանքը պաշտպանում է մարմինը սառեցումից՝ փոքրացնելով շերմատվությունը
5. մակուլեղը և մակերիկամի կեղևային շերտը իրականացնում են միզագոյացման հումորալ կարգավորումը
6. ավիշը տարբերվում է արյան պլազմայից սպիտակուցի ավելի քիչ պարունակությամբ
7. պասիվ արհեստական իմունիտետն առաջանում է, եթե օրգանիզմ են մտցնում տվյալ հիվանդության բուլացած կամ մահացած հարուցիչները

## Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

- սուկցեսիան, որը սկսվում է մերկ ժայռերի վրա, որտեղ բացակայում է հողը, կոչվում է առաջնային
- ազրուկոհամակարգերն օժտված են ինքնակարգավորմամբ, դոմինանտ տեսակները բնական ընտրության արդյունք են
- մրցակցությունը, զիշատչությունը էկոլոգիական ոչ կենսածին գործոններ են
- էկոլոգիական համակարգերում որպես ռեդուցենտներ հանդես են գալիս որոշ միջատներ, սնկերը, բակտերիաները
- նիտրիֆիկացնող բակտերիաներն ամոնիակը վերածում են ազոտային և ազոտական թթվի աղերի
- տեսակի ֆիզիոլոգիական չափանիշի հիմքում ընկած է նրա առանձնյակների արտաքին և ներքին կառուցվածքի նմանությունները

## Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

- Մենդելի անկախ բաշխման օրենքը վերաբերում է միայն այն հատկանիշների ժառանգմանը, որոնց պայմանավորող գույգ ալելային գեները գտնվում են տարրեր գույգ հոմոլոգ քրոմոսոմներում
- կաթնասունների ձվաբջջներում դեղնուց գրեթե չկա, և տրոհումն ամբողջական է, առաջացած բլաստոմներները հավասար են չափերով
- վերլուծող խաչասերման դեպքում անհայտ գենոտիպ ունեցող առանձնյակը խաչասերում են ռեցեսիվ գենով հոմոզիգոտ առանձնյակի հետ
- կրոսինգօվերի հետևանքով տեղի է ունենում քրոմոսոմների թվի կրկնակի պակասում
- Պատառի սինդրոմը կապված է գենում նուկլեոտիդային հաջորդականության փոփոխության հետ
- կատունների մարմնի գումավորումը X քրոմոսոմին շղթայակցված հատկանիշ է, և խայտարդետ լինում են էզ կատունները

(59-60) Ալիքաձև մազերը ստացվում են որպես միջանկյալ հատկանիշ, եթե ծնողներից մեկն ունենում է գանգուր մազեր, իսկ մյուսը՝ ուղիղ։ Ալիքաձև մազերով և արյան I խմբով տղամարդն ամուսնացել է ուղիղ մազերով և արյան IV խմբով կնոջ հետ։

59 Որոշել գանգուր մազերով երեխա ծնվելու հավանականությունը (%-ով)։

60 Որոշել ըստ տվյալ հատկանիշների երկինտերողիզոտ երեխա ծնվելու հավանականությունը (%-ով)։

Մեկ գրամ ջրի ջերմաստիճանը  $1^{\circ}\text{C}$ -ով բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է  $4,19 \Omega$  էներգիա: 100 կգ մարմնի զանգված ունեցող և ծանր ֆիզիկական աշխատանքով զբաղվող մարդու ծախսել է  $14246 \text{ kJ}$  էներգիա: Եթե չլինեին ջերմակարգավորման մեխանիզմները, և ընդունելով, որ այդ մարդու մարմնի ջերմաստիճանը  $1^{\circ}\text{C}$ -ով բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է այնքան էներգիա, ինչքան 100 կգ ջրի համար, ապա այդ էներգիան քանի<sup>o</sup> աստիճանով ( $^{\circ}\text{C}$ ) կբարձրացներ մարդու մարմնի ջերմաստիճանը:

(62-64) Գլյուկոզի ճեղքումից հետո օրգանիզմում մնացել է 32 մոլ կաքսաքթու, և էներգիայի կորուստը կազմել է 15520 կՋոուլ: 1 մոլ գլյուկոզից մինչև կաքսաքթու ճեղքման ընդհանուր էներգիան կազմում է 200 կՋոուլ, իսկ ԱԿՖ-ից ԱԵՖ-ի սինթեզի համար անհրաժեշտ է 30 կՋոուլ/մոլ էներգիա:

**62** Զանի<sup>o</sup> մոլ CO<sub>2</sub> է առաջացել այդ ընթացքում:

**63** Զանի<sup>o</sup> կՋոուլ է կազմում էներգիայի կորուստը անբավարար փուլում:

**64** Զանի<sup>o</sup> կՋոուլ է կազմում էներգիայի կորուստը թթվածնային փուլում:

- (65-66) Օրվա ընթացքում մաշկի մակերևույթից ջերմաճառագայթմամբ հեռացել է 23520 կՎ էներգիա: Հայտնի է, որ մաշկի մակերևույթից ջերմաճառագայթման միջոցով հեռացվում է ավելցուկային ջերմային էներգիայի 60%-ը, գոլորշիացման միջոցով՝ 20%-ը, ջերմահաղորդման միջոցով՝ 15%-ը: Հաշվի առնել, որ 1 գ քրտինքի գոլորշիացման համար ծախսվում է 2,45 կՎ էներգիա:

65

Ընդամենը որքա՞ն ջերմային էներգիա է հեռացվել մաշկի մակերևույթով մեկ օրվա ընթացքում (կՎ-ով):

66

Քանի՞ մգ քրտինք է հեռացվել այդ ընթացքում 1սմ<sup>2</sup> մակերեսից, եթե մաշկի մակերեսը 1,6 մ<sup>2</sup> է:

- (67-68) Հարաբերականորեն հանգիստ վիճակում մարդու սիրտը մեկ րոպեի ընթացքում կծկվում է 75 անգամ: Ֆիզիկական աշխատանք կատարելիս կծկումների թիվն ավելանում է 30%-ով:

67

Քանի՞ րոպե են կծկվում փորոքները 16 ժամ հարաբերական հանգստի վիճակում:

68

Քանի՞ լիտր արյուն են մղում շրջանառության փորոքները մարդու 8 ժամ ֆիզիկական աշխատանք կատարելու ընթացքում: Ընդունել, որ յուրաքանչյուր կծկման ժամանակ փորոքը զարկերակ է մղում 65 մլ արյուն:

69

Մարդու օրգանիզմի կառուցվածքին կամ այնտեղ իրականացվող գործընթացներին վերաբերող տրված 6 պնդումներից յուրաքանչյուրի համար ընտրել «Ծիշտ է», «Սխալ է», «Զգիտեմ» պատասխաններից մեկը.

1. ացետիլսոլինը, կալցիումի աղերը դանդաղեցնում են սրտի աշխատանքը
2. երկփեղկ փականների ոչ լրիվ փակման հետևանքով փորոքից արյունը կարող է անցնել ձախ նախասիրտ
3. ողնուղեղի կրծքային հատվածների կողմնային եղյուրներից ուղարկվող ազդակները դանդաղեցնում են սրտի աշխատանքը
4. կիսալուսնաձև փականները շարակցահյուսվածքային թելիկներով միացած են փորոքների պատերին
5. սրտի պատի ներքին շերտը կազմված է էպիթելային հյուսվածքից
6. կիսալուսնաձև փականներն արգելակում են արյան հետադարձ շարժումը բոքային զարկերակից և առոտայից դեպի սիրտ

70

Տրված 6 պնդումներից յուրաքանչյուրի համար ընտրել «Ծիշտ է», «Սխալ է», «Զգիտեմ» պատասխաններից մեկը.

1. միտոքոնուլիումների ներքին թաղանթում տեղակայված ԱԵՖ - սինթազի միջով պրոտոնները միտոքոնուլիումի ներքին թաղանթի ներքին մակերևույթից անցնում են ներքին թաղանթի արտաքին մակերևույթ
2. բջջում միտոքոնուլիումներն անընդհատ շարժվում են և փոխում իրենց ձևը
3. միտոքոնուլիումները բջջում կարող են առաջացնել ճյուղավորված ցանցեր
4. միտոքոնուլիումները քիչ են լյարդի, սեռական գեղձերի բջիջներում
5. միտոքոնուլիումների արտաքին թաղանթը հարթ է, դրանում քիչ են ֆուֆոլիպիդները և շատ են սպիտակուցները
6. միտոքոնուլիումներին բնորոշ է լիպիդների փոխանակությունը